

# Wondverzorging bij tumorulceraties

**Auteur:** J. Nooyen

**Vertaald/bijgewerkt:**

**Nieuwsbrief:** 1998

**Pagina:** 27-32

**Jaargang:** 14

**Nummer:** 2

**Toestemming:** Met toestemming overgenomen uit Janssen-Cilag Medisch-Wetenschappelijk Nieuws 1997;12(3):81-86.

**Illustraties:**

**Bijzonderheden:**

**Kernwoorden:** oncologische wond wondbehandeling oncologische ulcera huidtumoren huidmetastasen zwart-geel-rood classificatiemodel producten casus

**Literatuur:**

Wanneer een tumor doorgroeit naar de huid, kan een laesie ontstaan die gaat ulcereren. Naast problemen als pijn, jeuk, ascites, misselijkheid en braken, maken ook oncologische ulcera deel uit van de palliatieve problematiek bij patiënten met kanker. Ze kunnen namelijk zeer pijnlijk zijn, er onsmakelijk uitzien en - als gevolg van de groei van anaërobe bacteriën - een onaangename geur afgeven. In deze tijd waarin uiterlijk en hygiëne heel belangrijk worden gevonden, kan dat psychosociale problemen opleveren. Mensen met tumorulceraties komen daardoor snel in een isolement. Aan de ene kant hebben mensen in de omgeving er meer moeite mee om toenadering te zoeken; aan de andere kant trekken patiënten met tumorulceraties zich nogal eens terug uit schaamte voor hun wonden. De WCS probeert richtlijnen op te stellen voor de behandeling van tumorlaesies. Een moeilijke opdracht, omdat dergelijke laesies zeer heterogeen zijn. In dit artikel wordt besproken welke aspecten bij de wondverzorging van belang zijn.

## Typen tumorlaesies

Er zijn verschillende typen tumorlaesies. De WCS maakt onderscheid tussen oncologische ulcera, die zijn ontstaan door het tumorproces, en oncologische wonden, die zijn ontstaan als gevolg van behandeling.