

Veel decubitus in academische ziekenhuizen

Decubitus komt het meest voor in academische ziekenhuizen, zo blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Ook is gebleken dat het aantal decubituspatiënten in 2010 niet is gedaald in deze instellingen. Dit in tegenstelling tot de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

Uit de meting blijkt verder dat wisselligging nog veel te weinig wordt toegepast en dat het zelfs bij risicopatiënten, zoals op de IC, vaak niet standaard gebeurt. Het aantal decubitusgevallen is in de chronische zorg en in de thuiszorg gedaald ten opzichte van een jaar geleden en ligt tussen de 2 en 3 procent.

Opvallend is dat Nederland internationaal slecht scoort op de prevalentie van decubitus. Ter vergelijking: in Nederlandse verpleeghuizen heeft 1 op de 24 bewoners decubitus tegenover 1 op de 50 in Duitsland en 1 op de 62 in Oostenrijk. Dat komt waarschijnlijk omdat in die landen vaker aan wisselligging wordt gedaan en omdat er meer instructie en voorlichting wordt gegeven, denken de onderzoekers. De LPZ wordt jaarlijks verricht door onderzoekers van de Universiteit Maastricht in ziekenhuizen, de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. (MV)