

Minder lange wachttijden HIPEC-behandeling

Patiënten met dikkedarmkanker met uitzaaiingen in de buik worden binnenkort sneller geopereerd. Daartoe hebben chirurgen van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam) een samenwerking afgesloten met het VuMC.

Patiënten met dikkedarmkanker met uitzaaiingen in de buik komen veelal in aanmerking voor een zogenaamde HIPEC-behandeling. Bij deze ingreep wordt na het verwijderen van de tumor in de darm, de buik gespoeld met een hoge dosis cytostatica. Vijftien jaar geleden was de overlevingskans voor deze groep

patiënten klein. Na introductie van de HIPEC is deze geleidelijk gestegen tot een overleving van vijf jaar bij vijftig procent van de patiënten mits de operatie succesvol verloopt. Het NKI-AVL was het eerste instituut waar de HIPEC werd toegepast. Inmiddels voeren meerdere ziekenhuizen deze behandeling uit. Het team van specialisten dat in het VuMC deze operatie zal uitvoeren wordt opgeleid door NKI-AVL chirurg dr. Vic Verwaal. Jaarlijks ondergaan in Nederland 150 patiënten een HIPEC-behandeling. Door de capaciteitsuitbreiding stijgt dat naar 170.