

TUCHT



Klacht over decubitus ongegrond

Een patiënte heeft een klacht ingediend tegen haar gynaecoloog omdat zij na een grote buikoperatie decubitus ontwikkelde aan de hielen.

Het regionaal tuchtcollege in Eindhoven vond de klacht ongegrond omdat door of tijdens de operatie niets is gebeurd dat kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van de decubitus.

Tijdens de tuchtzaak werd duidelijk dat de vrouw gedurende twee uur op de operatietafel heeft gelegen op een zachte matras. Haar voeten zijn niet in contact geweest met iets anders dan de matras. Naast reguliere narcose heeft de vrouw epidurale pijnbestrijding gekregen. De volgende dag zat er een grote blaas op haar rechterhiel. Toen is direct de decubitusverpleegkundige ingeschakeld. De volgende dag zat er ook een blaas op de linkerhiel. De vrouw knapte verder goed op na de operatie en ging met kapotte hielen met ontslag. Op de rechterhiel ontstond een diepe decubitus, graad 4. De wonden moesten dagelijks verzorgd worden en de vrouw moest twee keer per week voor wondzorg naar het ziekenhuis. Na drie maanden was de wond op de rechterhiel uiteindelijk dicht maar had de patiënte nog fysiotherapie nodig om de enkel weer beweeglijk te maken. De vrouw moest haar werk in een winkel opgeven en had na anderhalf jaar nog regelmatig pijn aan de voet.

De gynaecoloog, die overigens pas anderhalve maand na de operatie hoorde dat de vrouw hieldecubitus had ontwikkeld, verklaarde dat de protocollen van het ziekenhuis waren nageleefd en dat er geen andere risicofactoren zoals diabetes of vatlijden aanwezig waren die het risico op decubitus verhogen. Het tuchtcollege vond de klacht daarom ongegrond.

Niet duidelijk is geworden of in de protocollen is opgenomen of de hielen tijdens de operatie vrij moeten liggen. In de nieuwe richtlijn *Decubitus preventie en behandeling* zijn aanbevelingen opgenomen om te voorkomen dat operatiepatiënten decubitus ontwikkelen.