

LICHTE DALING DECUBITUS IN ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN

Decubitus komt nog steeds het meest voor in academische ziekenhuizen, zo blijkt uit de *Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) 2010*. Wel is het voor het eerst in jaren een lichte daling te zien.

Met de LPZ wordt elk jaar gemeten hoe het gaat met de prevalentie, preventie en behandeling van decubitus, ondervoeding, incontinentie en smetten in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook wordt gekeken hoe het staat met valincidenten en vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij een op de acht cliënten in de academische ziekenhuizen zijn in 2010 doorligwonden gevonden. Vooral op intensive care-afdelingen blijft het een probleem, daar heeft bijna een op de drie patiënten decubitus of een voorstadium ervan. Niet alleen komt decubitus het meest voor in academische ziekenhuizen, patiënten ontwikkelen er ook het vaakst decubitus terwijl decubitus te voorkomen is door bijvoorbeeld wisseling toe te passen. Waarom dit onvoldoende gebeurt, konden de onderzoekers niet achterhalen.

De LPZ wordt jaarlijks uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht; dit jaar deden 391 instellingen met in totaal meer dan 40.000 cliënten mee aan de meting. Meer informatie www.lpz-um.eu