



Kenniscentrum Wondzorg

Atypische beenwonden

Corien Dekkers MANP
Verpleegkundig Specialist
Amphia Ziekenhuis
Breda

Wat zie je hier?




Arterieel ulcus

Ulcus als gevolg van arteriële insufficiëntie.

Verschijselen arteriële insufficiëntie:

- Claudicatio klachten.
- Rustpijn.
- Slecht genezende pijnlijke ulcera.
- Koude blauw/witte voeten.
- Weinig of geen beharing.
- Pulsaties zwak of afwezig.
- Afwijkende enkel-/ arminindex.



Arteriële insufficiëntie



Stadia volgens Fontaine

- I → Asymptotisch
- II → Claudicatioklachten
 - Ila: niet invaliderend
 - Ilb: invaliderend
- III → Rustpijn
- IV → Kritische ischemie / necrose




Behandeling arterieel ulcus


- Verwijzing vaatchirurg voor verdere diagnostiek en eventueel behandeling (dotteren, bypass).
- Indien mogelijk looptraining.
- Aanpassing levensstijl.
- Stoppen met roken.
- Regulering hypertensie en hypercholesterolemie.
- Afvallen.
- Wondzorg.



Dotteren = percutane transluminale angioplastiek (PTA) +/- stent



1. De ballonkatheter gaat door de plaque op het punt waar de slagader is vernauwd.



2. De ballonkatheter wordt opgeblazen.



3. De ballonkatheter wordt teruggetrokken, waardoor de vernauwing in de slagader wordt opgeheven.



1. De slagader blijft vernauwd na coronaire angioplastiek





2. De ballonkatheter wordt opgeblazen en de stent ontvouwt zich



3. De stent wordt geïmplant en blijft permanent op zijn plaats

Bypass



Wat zie je hier?



Diabetische voet ulcus

- Wond aan een voet als gevolg van complicaties bij diabetes mellitus.
- Ontstaat vaak door druk en gestoorde microcirculatie.



Diabetische voet ulcus

Bij diabetes kunnen de volgende complicaties voorkomen:

- Angiopathie (bloedvaten)
- Neuropathie (zenuwen)
- Nefropathie (nieren)
- Retinopathie (ogen)

Behandeling diabetische voetulcus

- Goede regulatie bloedsuikers.
- Infectie bestrijden.
- Wondzorg.
- Druk ontlasten, bijvoorbeeld door polstering (total contact cast), aangepaste schoenen.
- Goede voetverzorging door pedicure met diabetesaantekening.



Wat zie je hier?



Ulcus van Martorell

- Voorkomend bij patiënten met langdurige, ernstige en meestal suboptimaal ingestelde hypertensie.
- Oorzaak: ischemie ten gevolge van een verhoogde vaatweerstand.
- In begin meestal zwart-necrotisch en zeer pijnlijk.

Behandeling ulcus van Martorell

- Goede regulering van de bloeddruk.
- Eventuele bètablokker vervangen door andere medicatie.
- Antistolling (acenocoumarol).
- Pijnbestrijding (lopen!).
- Reguliere wondzorg, eventueel met negatieve druktherapie en punchgrafts.

Wat zie je hier?



Vasculitis

Ontsteking van de bloedvaten van de huid.

Oorzaken:

- Infecties.
- Geneesmiddelen.
- Auto-immuunziekten.
- Kanker.
- Onbekende oorzaak.

Behandeling vasculitis

- Rust.
- Indien mogelijk behandeling onderliggende oorzaak.
- Bescherming van de huid (zwachtelen).
- Eventueel prednison.
- Eventueel wondverzorging.

Wat zie je hier?



Pyoderma gangrenosum

- Ontstaat vrij plotseling, met donkere verkleuring.
- Onbehandeld snelle verergering en ulceratie.
- Opgeworpen wondranden en ondermijning.
- Zeer pijnlijk.
- Bij onderliggend lijden: M. Crohn, colitis ulcerosa, RA.

Behandeling pyoderma gangrenosum

- Necrose verwijderen.
- Lokale corticosteroiden (dermovate/zink).
- Adequate pijnstilling.
- Indien geen vooruitgang prednison.
- Ambulante compressietherapie of verbandkniekous.
- Geen punchgrafts.
- Behandeling onderliggend lijden.
- Eventueel een biological.



Wat zie je hier?



Necrobiosis lipoidica

- Chronische goedaardige huidaandoening met huidatrofie.
- Duidelijk verband met diabetes mellitus.
- Wonden ontstaan spontaan of traumatisch.
- Meestal op het scheenbeen.
- Relatief weinig (pijn)klachten.

Behandeling necrobiosis lipoidica

- Eventueel wondbehandeling.
- Corticosteroiden (dermovate/zink).
- Lokale immunosuppressiva, zoals Protopic.



Wat zie je hier?



Erysipelas

- Acute ontsteking van de huid, veroorzaakt door streptokokken.
- Port d'entree vaak tussen de tenen (schimmelinfectie).
- Plotseling gevoel van ziek zijn, misselijkheid, braken, hoge koorts.
- Pijnlijk, zich snel uitbreidend erytheem, scherp begrensd en iets verheven.
- Soms met blaarvorming (bulleus).

Behandeling erysipelas

- Antibiotica, eventueel intraveneus.
- Koude kompressen in de acute fase.
- Eventueel wondzorg.
- Ambulante compressie therapie om lymfoedeem te voorkomen.
- Later aanmeten therapeutisch elastische kous.
- Goede voethygiëne.



Wat zie je hier?




Basaalcelcarcinoom

- Meest voorkomende vorm van huidkanker.
- Meestal op veelvuldig aan de zon blootgestelde delen van de huid.
- Zait vrijwel nooit uit, groeit wel door en kan ulcereren.
- Diagnose wordt gesteld aan de hand van klinisch beeld of een biopt.

Behandeling basaalcelcarcinoom

- Excisie.
- Photodynamische therapie.



Wat zie je hier?



Plaveiselcelcarcinoom

- Komt voor op veel aan de zon blootgestelde delen van de huid.
- Kan via lymfebanen uitzaaien naar inwendige organen.
- Begint meestal met een verdikte schilferige plek.
- Diagnose door middel van een biopt.

Behandeling plaveiselcelcarcinoom

- Excisie eventueel met transplantaat.
- Soms bestraling en bij metastasen chemotherapie.



Bedankt voor de aandacht!