

Hypostatisch eczeem bij chronisch veneuze insufficiëntie (CVI)

Chantal van Weersch

Wondconsulent & Verpleegkundig Specialist AGZ

Team Wondzorg Zuid-Limburg - Zuyderland thuiszorg

WCS commissielid ulcus cruris/ dermatologie

18^{de} WCS Wondcongres 18 april 2023

Disclosure belangen spreker

(Potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">- Sponsoring of onderzoeksgeld- Honorarium of andere (financiële) vergoeding- Aandeelhouder- Andere relatie, namelijk	N.v.t.


Hypostatisch eczeem

- ▶ Ook wel eczema hypostaticum, stasis eczeem, stasis dermatitis of eczema cruris genoemd.
- ▶ Eczeem gelokaliseerd aan de onderbenen bij veneuze insufficiëntie.



Veneuze systeem

- ▶ Veneuze systeem (de aderen) zorgt voor de afvoer van bloed. Zuurstofarme bloed van de weefsels gaat terug naar het hart.
- ▶ Wanneer de aderen dat niet meer goed doen, spreekt men van **veneuze insufficiëntie**.



Hypostatisch eczeem

- ▶ Veroorzaakt door veneuze hypertensie.
- ▶ Meestal vrouwen van middelbare leeftijd of ouder.

Ontstaanswijze

- ▶ Exacte pathogenese is onbekend.
- ▶ Begin ontstaat een gelokaliseerde rode macula of licht geïndureerde plaque, die nog niet schilfert.
- ▶ Later bij schilfering noem je de term hypostatisch eczeem.

Hypostatisch eczeem

- ▶ Vrouw, 60 jaar
- ▶ TEK klasse 2
- ▶ Jeuk +
- ▶ Gedurende 3 maanden
- ▶ Verwijzing HA -
vaatchirurgie



Hypostatisch eczeem

- ▶ Resultaat na 1 week
- ▶ 1x per dag smeren met corticosteroiden zalf klasse 4



Hypostatisch eczeem



Hypostatisch eczeem



Hypostatisch eczeem



Hypostatistisch eczeem



Behandeling

- ▶ Sterk werkende corticosteroiden zalven
- ▶ Compressie therapie

Indeling dermatocorticosteroiden

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Zwak werkend	Matig-sterk werkend	Sterk werkend	Zeer sterk werkend
Hydrocortison	Clobetason Flumetason Hydrocortisonbutyraat Triamcinolonacetonide	Betamethason Desoximetason Fluticason Mometason	Betamethason in propyleenglycol Clobetasol

Vingertopeenheid (VTE of FTU)

Leeftijd	Aantal FTU per keer smeren					Hele lichaam
	Hoofd en hals	Arm en hand	Been en voet	Romp (voorkant)	Rug en billen	
Volwassene	2.5	4 (alleen hand: 1)	8 (alleen voet: 2)	7	7	40.5
Kind 6 - 10 jaar	2	2.5	4.5	3.5	5	24.5
Kind 3 - 5 jaar	1.5	2	3	3	3.5	18
Kind 1 - 2 jaar	1.5	1.5	2	2	3	13.5
Kind 3 - 12 maanden	1	1	1.5	1	1.5	8.5

Differente & indifferente zalven en crèmes

- ▶ Differente zalven crèmes: MET medicijn toegevoegd
- ▶ Indifferente zalven crèmes: ZONDER medicijn toegevoegd


Zalf versus Crème

- ▶ Bij nattend eczeem
crème basis
- ▶ Bij droog eczeem
vette basis



Belangrijke pijler in de nazorg van hypostatisch eczeem

- ▶ Smeren met indifferente zalven crèmes!



Bedankt voor
jullie
aandacht !