


WONDZORG NA ONCOLOGISCHE RECONSTRUCTIE

Met een voorhoofdslap (VHL)



- Wondzorgkundige Radboud UMC
Yvonne Boerman Wijers
- Wonconsulent Erasmus MC
Hilde de Visser

Radboudumc

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

DISCLOSURE BELANGEN SPREKERS

(potentiële) Belangenverstrengeling	Geen / Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of ander (financiële) vergoeding	<ul style="list-style-type: none">• Geen• Honorarium naar afdeling (HBO Zorgopleidingen)• Ja, vergoeding lessen elders
<ul style="list-style-type: none">• Alle patiënten in deze presentatie gaven toestemming voor het gebruik van de foto's	


VOORBEREIDING OP DE OPERATIE

Vorbereiding:

- Stoppen met roken
- Optimale voedingstoestand

Beïnvloedende factoren voor de wondgenezing

- Bestralingen
- Comorbiditeiten (Diabetes Mellitus)
- Medicatie gebruik (prednison, MTX)





DE OPERATIE

Post operatief:

- Wondzorg gesteelde lap
- Wond op het voorhoofd
- Wond bij het oor

- Complicities (milde, ernstige)



STANDAARD ZORG VHL

Leefregels

Wondverzorging

- Dagelijks
- Reinigen
- Verbinden vs open laten
(Beleids afhankelijk van Ziekenhuis)

Esthetiek

Contact opnemen bij

- Koorts
- Toename van pijn
- Toenemend meer wondvocht afvloed
- Zwelling of rooheid rond de wond/ littekens
- Blijven lekken van bloed uit de vaatsteel
- als u de wond niet vertrouwd





WONDVERZORGING

benodigheden:

- Wattentips/ wattenstaafje of pincet
- Vet zalfgaas (paraffine)
- Secundair verband

werkwijze:

- aanwezige wondverband verwijderen
- spoelen onder de douche met handwarm water en zachte straal
- met behulp van wattentip huid onder de steel reinigen
- Aanbrengen van vet zalfgaas om de steel
- Aanbrengen secundair verband



WOND OP HET VOORHOOFD

Oorzaak:

- Open laten defect
- Onder spanning primair gesloten welke gaat wijken
- Wondinfectie

Doel:



- Secundaire wondgenezing



Zonder periost

WOND OP HET VOORHOOFD



Secundaire wondgenezing



VERZORGING WOND OP HET VOORHOOFD

Secundaire wondgenezing

- Optimaal wondmilieu creëren
- Blootliggend bot, hoe hiermee om te gaan
- Verbinden



COMPLICATIES

Kort na de operatie



Nabloeding

- Medicatiegebruik
(bloedverdunners)

- blijvend lekken van bloed uit de vaatsteel
Interventie:

Opsporen bloeding;
stelpen met hemostatisch verband, collageen spons



Direct contact met hoofdbehandelaar



INFECTIE

- roodheid, warmte, zwelling, pijn en verminderd functioneren


**Direct contact opnemen met
hoofdbehandelaar**



AFSTERVEN VAN WEEFSEL



Direct contact opnemen met hoofdbehandelaar



VERVOLG OPERATIE(-S)

- Vervolg operatie in verschillende fases
- Continueren van wondzorg

